

Hypericum coris

Hypericum coris L., Sp. Pl.: 787 (1753)

Millepertuis verticillé


Cori

Hypericaceae

Chaméphyte

Sud européen montagnard

Sans protection réglementaire - LRRR : vulnérable



—

Éléments descriptifs

Hypericum coris est une plante de 10 à 30 cm de hauteur qui se distingue de tous les autres millepertuis observables en Vanoise, par ses feuilles linéaires qui ressemblent à des petites aiguilles à bord enroulé, verticillées par trois à cinq. Les pétales d'un peu moins de 2 cm de longueur sont jaunes, légèrement striés de rouge. Les sépales oblongs et obtus présentent sur leur pourtour des glandes noires pédicellées.

Écologie et habitats

Le Millepertuis verticillé est une plante héliophile et calcicole. Nous l'observons en Vanoise en versant sud, sur des falaises, des rochers et parfois sur de vieux murets. Indiqué dans les flores des étages collinéen à subalpin, sa présence se limite en Savoie à une petite zone comprise entre 1800 et 1900 m d'altitude. *Hypericum coris* est un élément de l'alliance phytosociologique du *Potentillion caulescentis*.

Mont-Cenis, sur le versant dominant l'Italie. De fait, ces plantes font partie de la population italienne piémontaise qui déborde très localement sur le territoire français.

Menaces et préservation

Localisées sur à peine quelques centaines de mètres carrés, les deux petites populations savoyardes d'*Hypericum coris* sont très sensibles à toute perturbation de leur milieu de vie. Toutefois, les sites sont peu accessibles et relativement à l'abri d'éventuels herbivores et cueilleurs. Une des deux populations est par ailleurs incluse dans le périmètre protégé par l'Arrêté préfectoral de protection de biotope du mont Cenis. La veille régulière exercée par les agents du Parc national sur ces stations doit garantir la préservation de cet élément tout à fait original de la flore de Savoie.

Distribution

L'aire de distribution d'*Hypericum coris* se restreint aux Alpes et aux Apennins. Sur ces deux chaînes de montagne sa présence est très fragmentée, liée à quelques massifs calcaires en Suisse, en Italie et en France. Dans notre pays, il n'est connu que des Alpes du Sud, dans les départements du Var, des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, ainsi qu'en Savoie. Récolté au mont Cenis par J.-L. Bonjean (1780-1846) (herbier des Conservatoire et Jardin Botaniques de la ville de Genève), il a été retrouvé en ces lieux seulement à la fin du XX^e siècle (Delahaye, 1998). Il est actuellement recensé uniquement sur deux petits secteurs au sud de la commune de Lanslebourg-