

Paronychia polygonifolia

Paronychia polygonifolia (Vill.) DC., *Fl. Franç.*, ed. 3, 3 : 403 (1805)

Paronyque à feuilles de renouée


Paronichia con foglie di poligono

Caryophyllaceae

Hémicryptophyte, chaméphyte

Sud-ouest européen montagnard

Sans protection réglementaire - LRRA : préoccupation mineure



© Parc national de la Vanoise - Régis Jordana

Éléments descriptifs

La Paronyque à feuilles de renouée est une plante vivace aux tiges couchées et étalées. Les feuilles sont petites, lancéolées et glabres. Elles sont opposées et assez proches les unes des autres. À leur base s'observent des stipules, assez larges, membraneuses et terminées en pointe. Les fleurs sont petites, discrètes, sans pétales. Elles sont disposées en têtes latérales et terminales parsemées de feuilles et de bractées. Ces dernières, lancéolées et acuminées, se remarquent par leur aspect scarieux et argenté. C'est donc une plante discrète à l'aspect touffu qui au premier coup d'œil pourrait être confondue avec *Polygonum aviculare*. Cette dernière possède cependant des inflorescences avec de petits pétales blanc rosé.

Écologie et habitats

La Paronyque à feuilles de renouée est une plante qui pousse sur les substrats rocheux, sableux, toujours sur silice. Ce type de biotope, xérique, pauvre en éléments nutritifs, très drainant limite la présence d'autres espèces. Nous observons typiquement la Paronyque à feuilles de renouée sur les chemins et pistes rocailleuses attestant une tolérance de l'espèce au piétinement ; elle pousse aussi dans les éboulis. Bien présente à l'étage subalpin nous la connaissons en Vanoise, de 1700 à 2650 m d'altitude.

Distribution

C'est une espèce des montagnes du sud-ouest de l'Europe, présente jusqu'en Turquie ainsi qu'au Maroc (Prunier, 2001). En France, elle est connue dans les Pyrénées, le Massif central, la Corse et les Alpes. Pour les Alpes, elle n'est signalée que du

piémont occidental de l'Italie et en France de la Savoie aux Alpes-Maritimes. En Savoie, la Paronyque à feuilles de renouée est recensée sur les chaînes cristallines de la Lauzière et de Belledonne, dans le Beaufortain et en Vanoise. Sur ce massif, elle est inventoriée en Maurienne sur quelques sites d'Orelle à Bonneval-sur-Arc. Elle est encore plus localisée en Tarentaise, observée uniquement à Montvalezan, Séz et Sainte-Foy-Tarentaise

Menaces et préservation

Il semble qu'il y ait peu de menaces particulières qui pèsent sur cette espèce dépourvue de statut de protection et qui s'accommode parfois de milieux d'origine anthropique : chemins et pistes. À cause de sa discrétion, la distribution en Vanoise de la Paronyque à feuilles de renouée n'est vraisemblablement connue que de manière partielle. C'est une espèce qui mériterait un effort complémentaire de prospection.