

Dactylorhiza lapponica

Dactylorhiza lapponica (Laest.) Soó, Nomina *Dactylorhiza* : 5 (1962)

Dactylorhiza pseudocordigera (Neumann) Soó ; *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó subsp. *lapponica* (Laest. ex Hartman) Soó

Dactylorhize de Laponie, Orchis de Laponie


Orchidea della Lapponia

Orchidaceae

Géophyte

Nord européen, alpin

Sans protection réglementaire - LRRA : données insuffisantes



© Parc national de la Vanoise - Félix Benoit

Éléments descriptifs

La tige, trapue, haute de 10 à 30 cm est creuse, faiblement compressible. Les feuilles sont peu nombreuses, regroupées à la base de la tige ; elles sont généralement maculées et présentent un port plutôt étalé et ne sont pas contractées en capuchon à leur extrémité. L'épi est lâche, composé d'un petit nombre (cinq à quinze) de petites fleurs purpurines à labelle nettement trilobé. Ces critères doivent permettre de distinguer l'Orchis de Laponie des autres dactylorhizes du même groupe (*Dactylorhiza majalis* subsp. *alpestris*, *Dactylorhiza traunsteineri*, etc.).

Écologie et habitats

L'Orchis de Laponie affectionne les suintements et marais alcalins, les prairies marécageuses. Ces zones humides sont souvent des clairières au sein de peuplements forestiers des étages montagnard et subalpin. On trouve là tout un cortège d'espèces caractéristiques du *Caricion davallianae* : *Eriophorum latifolium*, *Tolfieldia calyculata* et... *Carex davalliana*.

Distribution

La distribution de *Dactylorhiza lapponica* est globalement scindée en deux parties avec l'essentiel des populations dans le nord de la Scandinavie et l'Écosse. Les Alpes représentent la deuxième partie de l'aire de distribution de l'espèce. L'Orchis de Laponie est présent essentiellement dans toutes les Alpes centrales et orientales, beaucoup plus rare à l'ouest. Méconnu, il n'a été découvert que récemment en France, à Termignon, en Savoie, en 1996 (Armadeilh, 1997). Depuis, il a été observé dans la plupart des autres départements alpins. L'espèce

est effectivement présente en Haute-Maurienne et a été découverte également ailleurs en Savoie : vallée de l'Arvan, Beaufortain, etc.

Menaces et préservation

Préciser l'aire de répartition de *Dactylorhiza lapponica* en Vanoise semble être une priorité pour les années à venir. Cette espèce ne possède en France aucun statut légal de protection ; ses stations sont par ailleurs en dehors des espaces protégés. Les marais où elle est présente sont souvent ceinturés de forêts et sont menacés par la fermeture du milieu due vraisemblablement à une déprise du pastoralisme dans ces zones intermédiaires que sont les "montagnettes". À Termignon, en accord avec la commune, le Parc national a mené des travaux de débroussaillage et de coupe de Pins sylvestres sur la zone humide des Fontaignous où pousse également *Herminium monorchis*.