

Carex bicolor

Carex bicolor All., Fl. Pedem., 2 : 267 (1785)

Laîche bicolore, Laîche de deux couleurs


Carice bicolore

Cyperaceae

Géophyte, hémicryptophyte

Arctico-alpin

Protection nationale, annexe I - LRN, tome II - LRR : en danger



© Parc national de la Vanoise - Christian Balais

Éléments descriptifs

Voici une laîche qui fait exception à son genre parmi les nombreux *Carex* souvent difficiles à déterminer ! Avec ses gros épillets bigarrés (5 - 15 mm) de couleur "pistache et chocolat", formés d'utricules verdâtres dépassant nettement des écailles brun noirâtre obtuses, elle ne peut guère être confondue avec un autre *Carex*. De 5 à 20 cm de hauteur, cette plante vivace porte une tige trigone généralement courbée, prostrée, qui lui donne l'air d'avoir été piétinée. Les feuilles étroites (1 à 2 mm) rudes et glauques sont plus courtes que la tige dont l'extrémité est dépassée par la bractée inférieure.

Écologie et habitats

Hôte des tourbières basses arctico-alpines à tendance basophile, cette laîche affectionne les alluvions fines des torrents d'altitude, les bords de sources, lacs et marais, alimentés par des eaux froides et alcalines. Elle partage ces milieux avec d'autres espèces constituant l'alliance du *Caricion incurvae* dont elle est l'une des espèces caractéristiques. Elle s'observe fréquemment accompagnée de : *Carex frigida*, *Carex maritima*, *Juncus triglumis*, ou bien encore de *Trichophorum pumilum*. Dans les Alpes, *Carex bicolor* se situe principalement à l'étage alpin, plus rarement au subalpin. On peut ainsi le rencontrer, en Vanoise, de 1700 m (Les Allues) à 2850 m d'altitude (Aussois).

Distribution

Espèce type du cortège des relictés arctico-alpines, *Carex bicolor* est présent dans de nombreux pays de la frange boréale. Il est bien connu dans les pays scandinaves et en Europe centrale, ainsi que sur l'ensemble des Alpes jusqu'aux Carpates. Son aire

de distribution, sur le territoire national, s'étend aux Pyrénées centrales ainsi qu'à la plupart des départements alpins. Dès le XIX^e siècle, une dizaine de localités a été indiquée en Vanoise (Husnot, 1905-1906). De nos jours, les gardes-moniteurs du Parc ont repéré la Laîche bicolore sur la majorité des communes du Parc, sur plusieurs centaines de sites. Bien que discrète, il est probable que l'on puisse la découvrir dans la plupart des cirques glaciaires, en aire optimale d'adhésion comme dans le cœur du Parc national de la Vanoise.

Menaces et préservation

Les espèces du *Caricion incurvae* affectionnent les milieux humides qui sont d'une grande fragilité, tant par rapport aux atteintes qu'ils subissent : drainage, comblement, piétinement, que par la détérioration de la qualité des eaux. Les principales menaces proviennent d'aménagements touristiques et d'utilisations pastorales. Bien que plus difficiles à cerner, les changements climatiques constituent une menace bien réelle à prendre en compte. Si ceux-ci venaient à se traduire localement par un réchauffement, l'augmentation des températures entraînerait *ipso facto* un changement des conditions écologiques, fort préjudiciable pour cette laîche qui requiert des conditions proches d'un climat de type polaire. On peut considérer, à l'instar des autres espèces qui l'accompagnent, que *Carex bicolor* est menacé à la fois par les activités locales et par les changements climatiques globaux.