

Cerinth glabra

Cerinth glabra Miller, *Gard. Dict.*, ed. 8 : n° 2 (1768)

Mélinet glabre, Mélinet des Alpes


Erba-vajola alpina

Boraginaceae

Hémicryptophyte

Européen, ouest asiatique

Sans protection réglementaire - LRRA : quasi menacée



© Parc national de la Vanoise - Frantz Storck

Éléments descriptifs

Les boraginacées se singularisent souvent par la diversité de leur pilosité ; une des particularités du genre *Cerinth* est précisément de rassembler des plantes glabres ou glabrescentes ! Le bien nommé Mélinet glabre est une plante glauque, à feuilles embrassantes, haute de quelques décimètres qui se reconnaît principalement grâce à ses fleurs : les corolles en forme de tube long de 1 à 1,5 cm sont terminées par de tout petits lobes pointus et recourbés vers l'extérieur ; elles sont jaune pâle avec à mi-hauteur des taches violet foncé. *Cerinth minor*, plus largement répandu en Vanoise, montre des corolles également en tube, mais découpées dans la moitié supérieure en lobes linéaires connivents.

Écologie et habitats

Cerinth glabra est classiquement associé aux groupements végétaux des reposoirs (*Rumicion pseudalpini*) et des mégaphorbiaies (*Adenostylion alliariae*). Si sa présence semble effectivement liée à des sols riches en éléments nutritifs, sur calcaire, les quelques observations en Vanoise localisent également cette espèce dans des pelouses et des pâturages rocaillieux et frais, des étages montagnard supérieur et subalpin.

Distribution

Cerinth glabra a une aire de distribution qui s'étend sur l'ensemble du continent européen et l'ouest du continent asiatique. En France, il n'est connu que dans une dizaine de départements des massifs montagneux des Alpes, des Pyrénées et de Corse (où il est représenté par la sous-espèce *tenuiflora*). Concernant la Savoie, Perrier de la Bâthie (1928) localise cette

espèce en diverses localités notamment en Haute-Maurienne. Mais il s'avère que cet auteur a confondu *Cerinth glabra* et *Cerinth minor*. Le Mélinet glabre n'est actuellement connu avec certitude qu'en marge du massif de la Vanoise, notamment à Bozel et à Saint-Martin-de-Belleville pour ce qui concerne l'aire optimale d'adhésion du Parc.

Menaces et préservation

Aucune menace spécifique n'est identifiée pour les populations de Mélinet glabre en Vanoise. Son milieu de vie n'est pas non plus spécialement en régression. Toutefois, les rares stations repérées requièrent une attention particulière pour éviter tout risque de dégradation ou de disparition. Les recherches effectuées sur le terrain par les agents du Parc sont à poursuivre pour mieux connaître sa distribution.