

Gagea villosa

Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet, *Hort. Brit.* : 418 (1826)

Gagea arvensis (Pers.) Dumort.

Gagée velue, Gagée des champs


Cipollaccio dei campi

Liliaceae

Géophyte

Méditerranéen

Protection nationale, annexe I - LRN, tome II - LRRA : préoccupation mineure



© Parc national de la Vanoise - Joël Blanchemain

Éléments descriptifs

La Gagée velue, plante vivace de 10 à 15 cm peut être confondue avec les autres espèces du genre présentes en Vanoise, à savoir la Gagée fistuleuse, plus fréquente, la Gagée de Bohême et la Gagée jaune. Comme les autres gagées, *Gagea villosa* possède des fleurs en étoile à six tépales jaunes. Elles sont portées par des pédicelles pubescents, ce qui permet de la différencier de la Gagée jaune à pédicelles glabres. Les feuilles basales sont filiformes, pleines, à la différence de la Gagée fistuleuse à feuilles creuses. Hormis l'aspect pubescent propre à cette espèce, on remarquera les feuilles caulinaires lancéolées, groupées par deux, ainsi que l'ombelle composée de trois à dix fleurs, qui la différencie de la Gagée de Bohême, pauciflore. Pour ne pas la confondre avec cette dernière, il conviendra aussi d'examiner le style qui est pubescent chez *Gagea villosa*. La Gagée velue se caractérise encore par sa floraison très précoce, à partir de fin avril en Vanoise.

Écologie et habitats

La Gagée velue est une plante des étages collinéen et montagnard, habituellement associée aux cultures mais que l'on peut aussi rencontrer dans des friches ou en situation plus ou moins rudérale. Thermophile, elle semble pouvoir persister assez longtemps dans d'anciennes cultures où la pelouse à *Festuca valesiaca* et/ou *Bromus erectus* s'est reconstituée. Dans cette situation, elle est souvent plus abondante sur les marges des pelouses abandonnées, sur les talus, etc.

Distribution

Plante de l'Asie occidentale, de l'Afrique septentrionale et de l'Europe méridionale, *Gagea villosa* se rencontre en France dans

une grande partie du pays. Elle est en régression dans la moitié nord. En Savoie, elle est connue en Chautagne, dans la Combe de Savoie, en Maurienne de Montvernier à Lanslevillard, et en Tarentaise à Montgirod. Elle n'a pas été revue dans les environs de Moûtiers, ni à Aime et Bourg-Saint-Maurice. En Vanoise, on ne la trouve qu'en Maurienne disséminée de Saint-André à Aussois et assez présente, en fond de vallée, entre Termignon et Lanslevillard. Historiquement elle n'était pas indiquée en Maurienne (Gensac, 1974).

Menaces et préservation

Cette plante protégée ne se rencontre plus en Vanoise que dans des situations post-culturelles ou en marge de parcelles agricoles, le plus souvent fauchées. La fermeture de ces milieux par la poursuite de la disparition des pratiques agricoles favorables est le principal risque de régression des populations de Gagée velue. Par ailleurs, l'urbanisation des fonds de vallées cause directement la destruction de certaines populations comme à Lanslevillard en 2008 pour la construction d'un lotissement.