

Saxifraga retusa

Saxifraga retusa Gouan, *Illustr. Observ. Bot.*, 28 (1773) – *Saxifraga retusa* subsp. *augustana* (Vacc.) P. Fourn., *Quatre Fl. Fr.* : 474 (1936)

Saxifrage tronquée – Saxifrage valdôtaine


Sassifraga retusa – Sassifraga valdostana

Saxifragaceae

Chaméphyte

Sud européen montagnard (subsp. *retusa*) – ouest alpien (subsp. *augustana*)

Sans protection réglementaire - LRRR : quasi menacée



© Parc national de la Vanoise - Pierre Lacosse

Éléments descriptifs

Ces plantes forment des coussinets denses, assez durs au toucher. Les feuilles opposées, en croix vues de dessus, rappellent celles de *Saxifraga oppositifolia*. Elles ne sont cependant ciliées que dans la partie inférieure et possèdent trois à cinq pores à sécrétion calcaire au sommet. La tige florifère, longue de 1 à 5 cm porte de une à trois paires de feuilles espacées et glabres. Si les fleurs ont la couleur purpurine de la Saxifrage à feuilles opposées, elles s'en différencient cependant par les étamines qui dépassent largement la corolle. On distingue deux sous-espèces : *Saxifraga retusa* subsp. *retusa* à tige et sépales glabres et *Saxifraga retusa* subsp. *augustana* à tige et sépales poilus-glanduleux.

Écologie et habitats

Ces deux sous-espèces de *Saxifraga retusa* poussent aux étages alpin et nival. Elles affectionnent les zones de rochers et éboulis fins. Elles se différencient cependant par le choix de leur substrat. En effet, si la sous-espèce *retusa* préfère les sols siliceux, *Saxifraga retusa* subsp. *augustana* est plutôt calcicole, paraissant localisée sur les calchistes en Vanoise.

Distribution

Disséminée en Europe centrale et méridionale, l'aire de distribution de la sous-espèce *retusa* s'étend des Pyrénées aux Balkans et aux Carpates. Bien présente en Italie, elle demeure très rare en Suisse. La sous-espèce *augustana* est, quant à elle, une endémique ouest alpine. En France, la sous-espèce *retusa* est répertoriée sur les départements de l'Isère, des Hautes-Alpes et, tout récemment, sur la Savoie, en Vanoise : elle a

été localisée sur la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, près du col du Mont qui est frontalier avec le Valgrisenche italien (Delahaye, Mouton & Prunier, 2008). La sous-espèce *augustana*, n'est connue que sur les Alpes-Maritimes et la Savoie où elle était déjà citée par Eugène Perrier de la Bâthie (Perrier de la Bâthie, 1917 & 1928). Elle est à ce jour inventoriée en Vanoise uniquement sur la Haute-Maurienne, sur les communes de Aussois, Villarodin-Bourget, Bramans, Lanslebourg-Mont-Cenis et Bessans.

Menaces et préservation

Très rares dans les Alpes françaises et en Savoie, ces deux sous-espèces n'ont cependant aucun statut réglementaire de protection et de fait demeurent vulnérables. Les populations d'Aussois et Villarodin-Bourget bénéficient de la protection du cœur du Parc national et celles de Lanslebourg-Mont-Cenis et pour partie de Bramans de l'espace protégé par Arrêté préfectoral de protection de biotope du mont Cenis. Compte tenu de la responsabilité de la Vanoise pour la préservation de ces deux sous-espèces en France, une veille régulière s'impose, même si à ce jour les stations connues ne semblent pas directement menacées.