

Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides

Carex ornithopoda Willd. subsp. *ornithopodioides* (Hausm.) Nyman, *Consp. Fl. Eur.* : 772 (1882)

Carex ornithopodioides Hausm.

Laïche faux pied d'oiseau


Carice subnivale

Cyperaceae

Hémicryptophyte

Sud européen montagnard

Protection nationale, annexe I - LRN, tome I - LRRR : préoccupation mineure



© Parc national de la Vanoise - Maurice Mollard

Éléments descriptifs

Plante de petite taille (moins de 10 cm de hauteur), la Laïche faux pied d'oiseau peut passer inaperçue. Cependant une fois repérée, elle s'identifie assez aisément par son port prostré, ses tiges fortement recourbées se terminant par des épillets sombres et ses feuilles courtes d'un vert foncé. Aux alentours de 2000 m d'altitude, où elle peut cohabiter avec *Carex ornithopoda* subsp. *ornithopoda*, si un doute subsiste pour l'identification, il faudra se munir de sa loupe et se concentrer sur les utricules qui sont velus chez cette dernière et glabres et luisants pour la sous-espèce *ornithopodioides*.

Écologie et habitats

Carex ornithopoda subsp. *ornithopodioides* affectionne en Vanoise les rocailles, éboulis et pelouses écorchées sur terrains calcaires (surtout Trias moyen), cargneules et gypse. Elle est présente dans les étages subalpins et alpins principalement entre 2000 et 2900 m d'altitude. L'espèce ne semble pas supporter une trop forte concurrence et est absente des pelouses denses. Gensac (1974) associe cette plante à l'*Arabidietalia caeruleae*, groupement des combes à neige calcaires, mais elle s'observe plus souvent dans les biotopes cités ci-dessus et côtoie particulièrement *Androsace helvetica*, *Carex capillaris*, *Campanula cochleariifolia*... En Vanoise, elle est parfois présente aussi dans le *Caricion incurvae*.

Distribution

Cette sous-espèce est recensée dans la plupart des massifs calcaires européens (Carpates, Alpes et Pyrénées). En 1974, Gensac l'indique sur seulement trois communes du Parc :

Pralognan-la-Vanoise, Lanslebourg-Mont-Cenis et Villarodin-Bourget mais précise que cette espèce est à rechercher. Presque quarante ans plus tard l'espèce est connue sur seize communes. Elle semble présente majoritairement en Tarentaise et particulièrement sur le secteur de Pralognan-la-Vanoise avec des altitudes extrêmes de 3015 m à Champagny-en-Vanoise et de 1810 m à Pralognan-la-Vanoise. Cependant sa discrétion et sa localisation en altitude laissent espérer encore de nouvelles découvertes.

Menaces et préservation

La Laïche faux pied d'oiseau est localement abondante en Vanoise ; peu spectaculaire, elle n'est pas sujette aux cueillettes. La principale menace réside dans les aménagements touristiques, notamment l'équipement en remontées mécaniques (pylônes, gares d'arrivées) et dispositifs de déclenchement des avalanches (CATEX, GAZEX).